PHU AGROMIX
TWÓJ PARTNER W GOSPODARSTWIE

Schemat wiosennego nawożenia doglebowego ziemniaka

Ilość dostarczonych składników w kg/ha w zależności od kierunku użytkowania i wczesności

N - 171-194 P_2O_5 - 75-105 K_2O - 150-210 S - 60-68 Mg - 50 Zn - 2,5-3,5	1	MacroSpeed® Perfect 0,5-0,7 t/ha	Pulan® 0,3 t/ha	MacroSpeed® Green 0,2 t/ha	Pulrea® 0,15-0,2 t/ha
N - 171 P_2O_5 - 90-126 K_2O - 150-210 S - 79-98 Mg - 50 Zn - 1,5-2,1 Mn - 1-1,4	2	MacroSpeed® Optima 0,5-0,7 t/ha	Salmag® 0,4 t/ha	MacroSpeed® Green 0,2 t/ha	Polifoska® 21 0,3 t/ha
N - 132 P_2O_5 - 92 K_2O - 120-180 S - 68-102 Mg - 40-60	3	Polidap® 0,2 t/ha	Patentkali® 0,4-0,6 t/ha + ZAKsan® 0,3 t/ha		
N - 173 P_2O_5 - 90 K_2O - 250 S - 89 Mg - 50 Zn - 1,5 Mn - 1	4	MacroSpeed® Optima 0,5 t/ha	YaraBela™ Extran 27 (CAN) 0,3 t/ha + Kalisop® 0,2 t/ha	MacroSpeed® Green 0,2 t/ha	Pulgran® 0,2 t/ha

1 i 2 Zalecany program nawożenia odmian skrobiowych

3 Propozycja nawożenia odmian: jadalnych wczesnych i średnio wczesnych oraz z przeznaczeniem na frytki lub chipsy

4 Zalecany program nawożenia odmian jadalnych późniejszych



termin wysiewu | 3-5 tygodni przed sadzeniem | tuż przed sadzeniem | sadzenie | przed obredleniem

Notatki: